

PROGETTO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2011 – L.R. 75/95

ISTRUZIONI UTILIZZO COMPRESSE DI LARVICIDA BTI (*Bacillus thuringiensis var.israelensis*)

Le compresse non sono nocive per l'uomo, per gli animali o le piante, pertanto nel maneggiarle è sufficiente attenersi alle normali precauzioni igieniche.

L'azione del principio attivo, è mirata in modo specifico alle larve di zanzara.

Ogni compressa è sufficiente per trattare circa 50 litri d'acqua.

In caso di grosse cisterne, bidoni o comunque di grandi volumi d'acqua, è sufficiente mettere una o più compresse intere nel contenitore.

In caso di piccole raccolte d'acqua, far sciogliere ad esempio mezza compressa in 25 litri d'acqua o un quarto di compressa in 12.5 litri d'acqua (un annaffiatoio può essere la soluzione migliore), mescolare in modo da distribuire uniformemente il principio attivo nell'acqua.

È importante che la soluzione sia preparata al momento del suo utilizzo.

Versare una piccola quantità di soluzione nelle caditoie e nei ristagni d'acqua inamovibili una volta alla settimana e a seguito di eventi meteorici di un certo rilievo, ripetere l'operazione.

A causa della bassa persistenza del principio attivo è indispensabile il rispetto scrupoloso della tempistica del trattamento.

L'eventuale soluzione larvicida avanzata deve essere utilizzata entro le 24 ore.

ISTRUZIONI UTILIZZO COMPRESSE DI LARVICIDA A BASE DI DIFLUBENZURON

Il Diflubenzuron è un larvicida chimico, che agisce sugli stadi larvali, impedendo lo sviluppo della cuticola chitinoso e provocando la morte della larva stessa.

Le compresse vanno maneggiate attenendosi alle istruzioni e precauzioni riportate sulla confezione di vendita. In caso di contatto accidentale con occhi o altre mucose, attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione di vendita.

L'azione del principio attivo non è selettiva, ma agisce sugli stadi larvali di qualsiasi insetto e sulla microfauna presente in acqua. Per questo motivo, andrebbe limitato l'uso di questo larvicida, solo a ristagni d'acqua come ad esempio caditoie e tombini. Non utilizzare in bidoni o contenitori la cui acqua possa essere usata per irrigare orti e coltivi, o dove animali possano abbeverarsi, anche accidentalmente.

Utilizzare una compressa per ogni ristagno d'acqua, la persistenza è di circa 2/3 settimane, ripetere il trattamento a seguito di eventi meteorici di un certo rilievo.

Per informazioni o segnalazioni consultare il sito internet regionale www.zanzara-tigre.org o contattare il numero verde regionale 800-171-178 attivo dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.